

Vorlesung 01.11.2013

Filmtipp: Max Planck u. die Quantenphysik

Bohrsches Modell

Anwendung auf H-Atom → quantitative Beschreibung von Spektren

⊖
⊕ Coulombkraft = Zentrifugalkraft

$$\frac{e^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

stabile Bahnen: $L = mvr = n\hbar \quad n = 1, 2, 3, \dots$

Radius der stabilen Bahnen

$$e^2 = \frac{mv^2 r^2}{r} = \frac{m^2 v^2 r^2}{mr} = \frac{n^2 \hbar^2}{mr}$$

$$\hookrightarrow \boxed{r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{e^2 m}} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$r_1(\text{H}) = \frac{\hbar^2}{e^2 m} = 5.3 \cdot 10^{-11} \text{ m} = 0.53 \text{ \AA} = a_0$$

Energiezustände $E_{\text{ges}} = T + V$

$$T = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} \frac{e^2}{r} \quad V = - \int_{-\infty}^r F dx = \int_{-\infty}^r \frac{e^2}{r^2} dr = - \frac{e^2}{r}$$

$$E_{\text{ges}} = T + V = \frac{1}{2} \frac{e^2}{r} - \frac{e^2}{r} = - \frac{1}{2} \frac{e^2}{r}$$


$$\boxed{E_n = -\frac{me^4}{2n^2\hbar^2}} \quad n=1,2,3,\dots$$

Spektren:

$$h\nu = E_2 - E_1 = \frac{me^4}{2\hbar^2} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad n_2 > n_1$$

$$\frac{h\nu}{hc} = \tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \underbrace{\frac{me^4}{2\hbar^2 hc}}_{R_H} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

$R_H = \text{Rydberg-Konstante}$
 $= 109737 \text{ cm}^{-1}$



Kern bewegt sich mit

$$\mu = \frac{m_e \cdot m_p}{m_e + m_p} \rightarrow R_H = 109677 \text{ cm}^{-1} \text{ (exp.)}$$

Versagen BM

- 1) H-Atom ist kugelsymm.
- 2) He-Spektrum ($2e^-$)
- 3) Molekül-Spektren
- 4) Chem. Bindung

Heisenberg (1926) \rightarrow Matrizenmechanik

Schrödinger (1926) \rightarrow Wellenmechanik

2.3 Postulate

Postulat I:

- a) Jeder Zustand des Systems aus N Partikeln wird durch eine Funktion $\psi(q_1, \dots, q_{3N}, t)$ beschrieben.
- b) Größe $\psi^* \psi$ ist prop. der Wahrscheinlichkeit, q_1 zw. q_1 und $q_1 + dq_1$ etc. zur Zeit t zu finden.

$\psi(q_1, \dots, q_{3N}, t)$: zeitabhängige Wellenfkt.

$\psi(q_1, \dots, q_{3N})$: zeitunabhängige Wellenfkt.
Beschreibung eines stationären Systems

ψ enthält gesamte Info über System

ψ kann komplex sein \rightarrow nicht anschaulich

$\psi^* \psi$ ist immer reell!

$$z = a + ib \quad z^* = a - ib$$

$$z^* z = (a - ib)(a + ib) = a^2 - i^2 b^2 = a^2 + b^2 = |z|^2 \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$


Bornsche Deutung $\psi^* \psi = |\psi|^2$ (1926)

z.B. H-Atom

$\psi^* \psi d\tau$ beschreibt die Wahrscheinlichkeit, das e^- im Volumenelement $d\tau$ zu finden.

Konsequenzen der Bornschen Deutung

- 1) ψ -Fkt muss stetig sein
- 2) -"- -"- eindeutig -"-
- 3) Quadrat der ψ -Fkt muss integrierbar sein



$$\int_{\text{Raum}} \psi^* \psi d\tau = \text{endlich}$$

Normierung

$$\boxed{\int_{\text{Raum}} \psi^* \psi d\tau = 1}$$

Mathematische Betrachtung: Operatoren

Def: lineare Operatoren

$$1) \hat{P}(f+g) = \hat{P}f + \hat{P}g$$

$$2) \hat{P}(af) = a \hat{P}f$$

Bsp 1: ist $\frac{d}{dx}$ lin. Op.?

$$\frac{d}{dx}(f+g) = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(af) = a \frac{df}{dx}$$

Bsp 2: ist $\sqrt{\cdot}$ lin. Op.?

$$\sqrt{(2+2)} = \sqrt{4} = 2 \neq \sqrt{2} + \sqrt{2} = 1,41... + 1,41...$$

Def: hermitescher Operator \hat{a}

$$\int \psi_i^* \hat{a} \psi_j d\tau \equiv \int \psi_j \hat{a}^* \psi_i^* d\tau$$

z.B. $\hat{a} = i \frac{d}{dx} \rightarrow \hat{a}^* = -i \frac{d}{dx}$

$$\psi_i = e^{ikx} \rightarrow \psi_i^* = e^{-ikx}$$

$$\langle \psi_i | \hat{a} | \psi_j \rangle \equiv \langle \psi_j | \hat{a} | \psi_i \rangle^*$$

mit $\int \psi^* \psi d\tau = \langle \psi | \psi \rangle$

$\langle \psi |$ bra $| \psi \rangle$ ket

Satz: hermitesche Op. besitzen reelle Eigenwerte!

Bsp: $\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx}$ Ist $\hat{O} = i \frac{d}{dx}$ hermitesch?

$[0, L]$

$$\int_0^L \frac{1}{\sqrt{L}} e^{-ikx} \left(i \frac{d}{dx} \right) \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx} dx \stackrel{?}{=} \int_0^L \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx} \left(-i \frac{d}{dx} \right) \frac{1}{\sqrt{L}} e^{-ikx} dx$$

$$\frac{1}{L} \int_0^L e^{-ikx} (i^2 k) e^{ikx} dx = \frac{1}{L} \int_0^L e^{ikx} (i^2 k) e^{-ikx} dx$$

Eigenwertgleichung eines Operators

$$\hat{P}(q_i) f(q_i) = p f(q_i)$$

↑ ↑ ↑ ↑
Op. (Eigen-) Eigen- Fkt.
 Fkt. wert Fkt.

Bsp. 1 $\hat{p}(x) = i \frac{d}{dx}$ $f(x) = e^{ikx}$

$$i \frac{d}{dx} e^{ikx} = \underbrace{i^2 k}_{\text{Eigenwert}} e^{ikx}$$

Bsp 2: zeitunabhängige Schrödingergleichung

$$\hat{H} \psi = E \psi$$

Hamilton-operator Eigenfunktion Energieeigenwert Eigenfkt.